

Lussazione: danno legato alla trasformazione

Lussazione dovuta a lesioni avvenute durante la cattura o il trasporto

La presente fotografia mostra la differenza tra un danno dovuto alla trasformazione, a sinistra, e lesioni avvenute durante la cattura o il trasporto.

I piccoli ematomi di colore rosso vivo sono recenti (< 1 minuto) e si verificano durante lo stordimento (animali storditi) o la trasformazione (ad esempio la spiumatura).

Emorragie



Le emorragie si verificano durante la cattura, il trasporto e, se del caso, il ribaltamento dei volatili e il trasporto dei volatili vivi sui nastri trasportatori. Le emorragie da considerarsi lesioni avvenute durante la cattura sono di colore rosso scuro, estese, diffuse e più grandi di 3 centimetri. Esse si presentano sulle ali, sulle cosce o sul tronco. Le piccole emorragie (\pm 1 cm), di colore rosso scuro, tendono a verificarsi nel macello durante lo scarico e la sospensione e sui nastri trasportatori, ad esempio quando gli animali vivi vengono spostati o ribaltati.




Fratture dell'ala con emorragie estese.



Frattura della zampa con sanguinamento.



Emorragia da frattura e frattura sottostante.



Un esempio di come si presenta il problema sulla linea di macellazione. Un chiaro esempio di frattura esposta con sanguinamento.