



## COME STORDIRE/ABBATTERE I CONIGLI PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA

I conigli che non possono essere trasportati o che non si sviluppano adeguatamente devono essere abbattuti presso l'azienda agricola. L'abbattimento in azienda può avvenire anche per fornire la carne direttamente ai consumatori o ai rivenditori. In tutti i casi è obbligatorio lo stordimento previo. È necessario procedere stordendoli e **abbattendoli il più velocemente possibile** in modo da provocare una morte indolore. Tale informazione non prevale sulle **regole nazionali** che vietano o limitano queste procedure.


Lo stordimento e l'abbattimento devono essere eseguiti da operatori con un adeguato livello di competenza.

### INFORMAZIONI SUI CONIGLI

- ✦ In caso di timore, dolore o stress, i conigli tendono a «congelarsi», portandoli a non mostrare alcuna reazione visibile
- ✦ Maneggiare i conigli agitati **con cura** per evitare di causare ferite sia al coniglio che all'operatore
- ✦ Sollevarlo **dalla collottola** o dalla pelle **delle spalle** (**non sollevarlo mai dalle orecchie** – sono molto sensibili)

### STORDIMENTO/ABBATTIMENTO

Per uno stordimento efficace è fondamentale **maneggiarli e immobilizzarli in modo appropriato. Una volta che il coniglio è immobilizzato, si può procedere nei seguenti modi.**



### 1. PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO PENETRANTE/NON PENETRANTE


Un proiettile captivo penetrante viene sparato sul cranio per raggiungere il cervello. Un proiettile captivo non penetrante colpisce la fronte senza penetrare nel cranio. Dopo aver stordito il coniglio, procedere con il **dissanguamento entro 10 secondi** in modo da non farlo soffrire.

#### Immobilizzare e posizionare

- ✦ Posizionare il coniglio su una superficie antiscivolo con un fermo posteriore in modo che non possa indietreggiare
- ✦ Sostenere il coniglio con una mano sul collo e sulle spalle, con il pollice e l'indice sui due lati del collo
- ✦ Maneggiare la pistola con l'altra mano

#### Parametri

- ✦ Leggere le istruzioni del produttore per assicurarsi che la pistola a proiettile captivo sia adeguata per conigli
- ✦ I proiettili captivi penetranti devono avere un **diametro di almeno 6 mm**



## 2. STORDIMENTO ELETTRICO «SOLO-TESTA»


Questo metodo non abatterà il coniglio. Dopo aver stordito il coniglio, procedere con il **dissanguamento entro 10 secondi** in modo da non farlo soffrire

### Preparare l'attrezzatura

- ✦ **Bagnare l'area della testa del coniglio** dove verranno applicati gli elettrodi
- ✦ Indossare guanti e stivali di gomma

### Posizionare il coniglio

- ✦ Con una mano sostenere il coniglio dalla pancia o dalle zampe posteriori e con l'altra posizionare la testa tenendola dalle orecchie
- ✦ Oppure, tenere entrambe le zampe posteriori del coniglio con una mano mentre con l'altra si posiziona la testa tenendola dalle orecchie
- ✦ Posizionare gli elettrodi **tra la parte esterna degli occhi e la base delle orecchie**, lontano dal naso



### Controllare i parametri

#### PARAMETRI RACCOMANDATI PER LO STORDIMENTO/ABBATTIMENTO ELETTRICO

Tensione (volt - V)	Corrente (mA)	Frequenza (hertz - Hz)	Durata (secondi)
100-117	140-400	50	1-3

## 3. COLPO DA PERCUSSIONE ALLA TESTA

Utilizzato correttamente, questo metodo produce l'abbattimento. **Con questo metodo non si possono abbattere più di 70 conigli al giorno.**

### Posizionare il coniglio

- ✦ Sostenere il coniglio dalle zampe posteriori
- ✦ Utilizzare un oggetto pesante ma facile da maneggiare (ad esempio una mazza, una sbarra di ferro)
- ✦ Colpire il coniglio sulla parte superiore della testa, dietro le orecchie

### Controllare che sia incosciente

Assicurarsi che i conigli siano incoscienti prima di provvedere al dissanguamento. Controllare che:

*non apra e chiuda gli occhi (sia spontaneamente che al toccarli)*


*non cerchi di alzarsi/di sollevare la testa*

*non emetta alcun rumore*

*non respiri regolarmente*

*non reagisca se pizzicato o punzecchiato al naso/zampa/orecchio*

*le zampe siano rigide/tese con successivi spasmi/calci*



## DOPO LO STORDIMENTO

### Se il coniglio è ancora cosciente

- ✦ Non procedere con il dissanguamento
- ✦ **Stordire nuovamente con un metodo alternativo**
- ✦ Valutare quale procedura era stata realizzata in modo sbagliato
- ✦ Correggere eventuali problemi prima di procedere nuovamente con lo stordimento

### Confermare il decesso

- ✦ Non deve esserci alcun movimento spontaneo
- ✦ Non deve reagire se pizzicato o punzecchiato al naso/zampa/orecchio
- ✦ Il corpo deve essere privo di vigore/totalmente collassato
- ✦ Le pupille devono essere dilatate
- ✦ Non deve fare alcun rumore/respiro ansimante
- ✦ Non deve respirare
- ✦ Non deve esserci battito cardiaco
- ✦ Non deve esserci sanguinamento

