



COME STORDIRE/ABBATTERE I VOLATILI PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA

I volatili che non possono essere trasportati devono essere abbattuti presso l'azienda agricola. L'abbattimento in azienda può avvenire anche per ragioni quali malattia, crescita lenta o per fornire la carne direttamente ai consumatori o ai rivenditori. In tutti i casi è obbligatorio lo stordimento previo. È necessario procedere stordendoli e **abbattendoli il più velocemente possibile** in modo da provocare una morte indolore. Tale informazione non prevale sulle **regole nazionali** che vietano o limitano queste procedure.

Le operazioni di stordimento e abbattimento devono essere eseguite da operatori con un adeguato livello di competenza.

INFORMAZIONE SUI VOLATILI

- ✦ I volatili sono animali socievoli ma entrano in panico facilmente
- ✦ **Cosa conviene:** zone ben illuminate
- ✦ **Cosa non conviene:** luce diretta del sole, correnti d'aria

RICORDARE

- ✦ I volatili feriti potrebbero non essere in grado di muoversi senza dolore. Sarà necessario stordirli e abbatterli nel posto in cui si trovano **il più velocemente possibile**



STORDIMENTO/ABBATTIMENTO

Una volta che il volatile è immobilizzato, si può procedere nei seguenti modi:

1. STORDIMENTO ELETTRICO «SOLO TESTA»


Essendo un metodo che può non uccidere il volatile, è necessario procedere con il dissanguamento entro 15 secondi.

Collocare gli elettrodi

Gli elettrodi devono essere collocati attorno alla testa del volatile, **tra l'occhio e l'orecchio**

Controllare i parametri

- ✦ Corrente: polli 240 mA; tacchini 400 mA o superiore
- ✦ Tensione: sopra i 110V
- ✦ Durata: almeno 7 secondi



2. PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO PENETRANTE/NON PENETRANTE


Un proiettile captivo penetrante viene sparato sul cranio per raggiungere il cervello. Un proiettile captivo non penetrante colpisce la fronte senza penetrare nel cranio.

Posizione della pistola

- ✦ Posizionare la pistola sulla testa, **puntando verso il basso**

Controllare i parametri

- ✦ Leggere le istruzioni del produttore per verificare che il proiettile, la carica e la pressione siano adeguati
- ✦ Non penetrante: testa piatta per polli; convessa per anatre, oche e tacchini
- ✦ Procedere al dissanguamento entro 1 minuto



3. DISLOCARE IL COLLO

La dislocazione cervicale (tirare il collo) separa la colonna vertebrale dalla testa. **Con questo metodo non si possono abbattere più di 70 volatili al giorno.**

Immobilizzare e posizionare il volatile

- ✦ Con una mano sollevare e **sostenere il volatile dalle zampe**
- ✦ Avvolgere le dita dell'altra mano **attorno al collo del volatile** dalla parte posteriore del cranio
- ✦ Con un unico movimento continuo:
 1. Tirare entrambe le mani **velocemente e saldamente** nelle direzioni opposte
 2. Ripiegare bruscamente la testa all'indietro



4. PROVOCARE UN COLPO DA PERCUSSIONE ALLA TESTA


Con questo metodo non si possono abbattere più di 70 volatili al giorno.

Immobilizzare e posizionare il volatile

- ✦ Sostenere il volatile dalle zampe
- ✦ Appoggiare la testa su una superficie dura
- ✦ Colpisci la parte posteriore della testa del volatile con un oggetto pesante e facile da maneggiare

Controllare lo stato di coscienza

Dopo aver utilizzato i metodi del proiettile captivo, del colpo da percussione alla testa o della dislocazione, controllare che sussistano le seguenti condizioni:



DOPO LO STORDIMENTO

Se il volatile è ancora cosciente:

- ✦ Non procedere con il dissanguamento
- ✦ **Stordire nuovamente con un metodo alternativo**
- ✦ Individuare quale procedura era stata realizzata in modo sbagliato
- ✦ Correggere eventuali problemi prima di procedere nuovamente con lo stordimento

Per confermare il decesso del volatile, controllare che:

- ✦ Non ci sia alcun movimento spontaneo
- ✦ La carcassa/Le ali siano prive di vigore
- ✦ Non respiri
- ✦ Il sanguinamento si sia arrestato

